

MATERIAL SUPLEMENTARIO

Conocimiento sobre infecciones asociadas a la atención en salud en estudiantes de enfermería

Knowledge about infections associated with health care in nursing students

Lisette Johana Villacis Freire¹ , Verónica Graciela Jiménez Ayala¹  

¹Universidad Técnica de Ambato. Facultad Ciencias de la Salud, Carrera de Enfermería. Ciudad de Ambato, Ecuador.

Citar como: Villacis Freire LJ, Jiménez Ayala VG. Conocimiento sobre infecciones asociadas a la atención en salud en estudiantes de enfermería. Salud Cienc. Tecnol. 2022;2:137. <https://doi.org/10.56294/saludcyt2022137>

Recibido: 16-11-2022

Revisado: 24-11-2022

Aceptado: 03-12-2022

Publicado: 04-12-2022

Editor: Prof. Dr. Javier González Argote 

CUESTIONARIO DE CONTROL DE INFECCIONES CON LA RESPUESTA CORRECTA

1. Infección asociada a la atención de salud Respuesta correcta
A. El medio ambiente (aire, agua, superficies inertes) es la principal fuente de bacterias responsables de las infecciones asociadas a la atención de salud. NO
B. La edad avanzada o la edad muy temprana aumentan el riesgo de infección nosocomial. SI
C. Los procedimientos invasivos aumentan el riesgo de infección nosocomial. SI
D. La prevalencia de IAAS en el Ecuador en la actualidad es desconocida. SI
E. La prevalencia en América Latina de las infecciones es de 23,2 % lo que corresponde a un promedio de 1,4 episodios por cada uno de los pacientes que acuden a las instituciones de salud pública SI
2. Precauciones universales
A. Incluir las recomendaciones para proteger solo a los pacientes. NO
B. Incluir las recomendaciones para proteger a los pacientes y a los trabajadores sanitarios SI
C. Aplica para todos los pacientes SI
D. Aplica solo para trabajadores sanitarios que tengan contacto con el líquido corporal. NO
3. ¿Cuándo se recomienda la higiene de las manos?
A. Antes o después de estar en contacto con un paciente NO
B. Antes y después de estar en contacto con un paciente. SI
C. Durante el contacto con el paciente. SI
D. Después de la extracción de guantes. SI
4. Las precauciones estándar recomiendan el uso de guantes
A. Para cada procedimiento NO
B. Cuando existe riesgo de contacto con la sangre o líquido corporal SI
C. Cuando existe el riesgo de un corte SI
D. Cuando los trabajadores de la salud tienen una lesión cutánea SI
5. Cuando hay riesgo de salpicaduras o rociadas de sangre y fluidos corporales, los trabajadores de la salud deben usar.
A. Sólo mascarilla NO
B. Sólo protección ocular NO
C. Solo una bata NO
D. Mascarilla, gafas y bata SI
6. Debe realizarse un lavado de manos tradicional antes de lavarse las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol

- A. Un lavado de manos tradicional (30 s) SI
- B. En lugar de un lavado de manos antiséptico (30 s) SI
- C. Lavarse las manos quirúrgicamente (3 min) SI
- D. Antes de lavarse las manos, hay que lavarlas con un desinfectante de manos a base de alcohol. NO